

FB-BS-171/D Transfusionsmedizin UK- Aachen	Formblatt Anforderung von autologen Serum-Augentropfen	Seite 1 von 2
Erstellt am 29.08.2022 Dr. Hutschenreuter	Geprüft am 15.09.2022: Dr. Larionov Freigegeben am 01.10.2022 Prof. Dr. Klump	

<h1>FB-BS-171 / D</h1>	
<h2>Anforderung von autologen Serum-Augentropfen</h2>	
Dieses FB gilt ab:	01.10.2022
Diese FB ersetzt die Version:	FB-BS-171 / C
Zielsetzung:	Anforderung von autologen Serum-Augentropfen
Verteiler:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Original: QMB 2. Intranet
Änderungshinweise:	29.08.2022: Wechsel der Institutsleitung zum 01.10.2022, Prof. Dr. Klump

FB-BS-171/D Transfusionsmedizin UK- Aachen	Formblatt Anforderung von autologen Serum-Augentropfen	Seite 2 von 2
Erstellt am 29.08.2022 Dr. Hutschenreuter	Geprüft am 15.09.2022: Dr. Larionov Freigegeben am 01.10.2022 Prof. Dr. Klump	



Klinikdirektor:
 Univ.-Prof. Dr. rer. nat. H. Klump
 OA Dr. U. Krause Dect: 36242
 Dienstarzt Transfusionsmedizin:
 Dect: 36173

Patientenaufkleber

Anforderung für autologe Serum-Augentropfen

Für o. g. Patienten sollen aus augenärztlicher Indikation autologe Serumaugentropfen hergestellt werden. Die Serumaugentropfen stehen ca. 10 Tage nach der Blutentnahme zur Verfügung.

Dauer der Behandlung, Anzahl der Tagesdosen:

- | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 16 | Wochen (Maximum) | 120 | Tagesdosen (Ophtiolen) |
| <input type="checkbox"/> | 8 | Wochen | 60 | Tagesdosen (Ophtiolen) |
| <input type="checkbox"/> | 4 | Wochen (Minimum) | 30 | Tagesdosen (Ophtiolen) |
| <input type="checkbox"/> | <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> | Wochen* | <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> | Tagesdosen (Ophtiolen) |

*andere Mengen nur in Ausnahmefällen

Für eine Dauerbehandlung immer 120 Tagesdosen anfordern

Befunde, anamnestische Daten oder Erkrankungen, die im Rahmen der Blutentnahme von Bedeutung sein könnten:

*der Patient darf nicht nüchtern sein, vorhandene Befunde (EKG, Rö-Thorax) Liste der regelmäßig eingenommenen Medikamente sind mitzubringen. Bei pulmonaler Vorerkrankung ist ein Rö-Thorax des Pat. erforderlich, bei kardialer Vorerkrankung zusätzlich ein Belastungs-EKG (mind. 75W).

Anfordernder Arzt (Klartext, Stempel)

Datum / Unterschrift

Autologe Serumaugentropfen dürfen nur nach erfolgter Sterilitätstestung freigegeben und angewendet werden (ca. 10 Tage nach Blutentnahme). Sollten die Serumaugentropfen aus ärztlicher Sicht vorher benötigt werden, so ist in Ausnahmefällen eine frühere Abgabe möglich. **Die Verantwortung insbesondere bei möglichen Komplikationen und bei positiver Sterilitätskontrolle trägt dann allein der anfordernde Arzt.**

Ich fordere die Serumaugentropfen unter eigener Verantwortung vor Abschluss der Sterilitätskontrolle an:

Anfordernder Arzt (Klartext, Stempel)

Datum / Unterschrift